



مستشفيات جامعة أسيوط  
وحده مكافحة العدوى

## الإجراءات الواجب اتباعها بعد التعرض لوخز إبرة



د/ شيماء محمد اسامة  
أخصائي مكافحة العدوى

أ/ نجوى محمد جمال  
مدير ادارة التدريب الفني  
وتطوير التمريض

أ.د/ ايناس عبد المجيد  
وكيل الكلية لشؤون خدمة  
المجتمع وتنمية البنية

أ.د/ صفوت عبد الراضي  
وكيل الكلية لشئون الدراسات  
العليا

تحت اشراف

أ.د/ أحمد محمد مخلوف

\*\*N.B

- Never bend needles.
- Never remove needles from disposable syringes
- Recap needles only when absolutely necessary.
- Always dispose of needles in proper sharp container.



مع تحيات وحدة مكافحة العدوى

٢٠١٣



## - الإبلاغ عن الإصابة

وحده مكافحة العدوى ..... ٣٢٩٧

اداره مكافحة التلوث ..... ٣١٥١

▪ في حالة حدوث الأصابة أثناء وردية الصباح (حتى الساعة الثانية ظهرا) من السبت للخميس وفي غير العطلات

○ إبلاغ المسئول المباشر للمصاب الذي يحرص على توصيل المصاب فوراً إلى مكتب مكافحة العدوى الذي يخدم القسم أو الوحدة التي حدثت بها الإصابة (الأفضل خلال الساعة الأولى بعد الإصابة). حيث تقوم مشرفة مكافحة العدوى بالمهام التالية:

- تزويد المصاب بإستمارة الإبلاغ عن وخز الإبر والسنون أوالأدوات الحادة، أوإستمارة التعرض للدم أوسوائل الجسم

- التعرف على مصدر الأصابة (المريض أو غيره) والحالة المصلية له فيما يتعلق بـ HIV, HBV, HCV

## على كل من يتعامل مع المرضي إرتداء الواقيات الشخصية

### - الإسعافات الأولية:

- عدم لمس الأداة الحادة أو السن المتسبب في الإصابة.
  - محاولة تنظيف النزف من الجرح بدون عصر أو ضغط أو شفط لمكان الإصابة.
  - غسل موضع الإصابة جيداً بالماء الجاري والصابون (لم تثبت فعالية استخدام المطهرات في تقليل نسبة الاصابة بعد الوخز).
  - إذا دخلت قطرات من الدم أو سوائل الجسم داخل العين تغسل جيداً بماء نظيف أو محلول ملحي أو سوائل طبية معقمة
  - ينبغي القيام بتغيير الملابس الملوثة التي تناثر عليها الدم أو سوائل الجسم.
- عند حدوث إصابات قطعية شديدة، يتوجه المصاب إلى قسم الطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية.